

# Unite

Crop Stimulant

1L

A liquid crop stimulant fertilizer for foliar application to crops as listed.

يونايٲ

STORE AT ROOM TEMPERATURE  
KEEP OUT OF DIRECT SUNLIGHT

Active Ingredient

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Nitrogen (N) | 14.45% | 144.50g/L |
|--------------|--------|-----------|

التركيب

|        |          |
|--------|----------|
| 14.45% | نيتروجين |
|--------|----------|

S.G (at 20°C) 1.28

**Manufactured by:** Microbial Biological Fertilizers International (PTY) LTD  
Reg No: 2015/165672/07 • No. 144, 2nd Ave Modder East Orchards, Delmas, Mpumalanga, 2210  
Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711

**Marketed and Distributed by:** Green Apple for Agriculture Investment  
El Mounifia • Sadat City, Area N11, Block N7, Egypt • Email: [info@greenappleai.com](mailto:info@greenappleai.com) • Web: [www.greenappleai.com](http://www.greenappleai.com)  
Tel: +20 482670187 • Fax: +20 482670187

Unite is a Registered Trademark of N Laboratories (PTY) LTD



Performance

## Unite

A liquid amino acid crop stimulant fertilizer for foliar application to crops as listed.

## الشركة المنتجة والمصدرة : MBFI

بلد المنشأ : جنوب أفريقيا  
الشركة المستوردة : جرين ابل للاستثمار الزراعي  
ق 7 - منطقة 11 - مدينة السادات - المنوفية  
ت : 01034510000  
رقم التسجيل: 14128 بتاريخ 2020/02/23  
العبوة : 1 لتر

## DIRECTIONS FOR USE: USE ONLY AS DIRECTED

- Avoid mixing Unite with copper-based products, any phosphate containing fertilisers, miscible oils as well as highly alkaline materials such as bordeaux mixture and lime sulphur.
- Apply Unite in adequate amounts of water to ensure complete coverage of the crop.
- Shake well before use.
- Add Twister to increase response.
- Follow the standard tank mixing procedures.
- Keep from freezing and keep in a cool dry place.
- Do not apply as a concentrate.

Also consult with your agronomist should crop specific programmes or any other information be required about the use of Unite such as recommendations based on plant and/or soil analysis.

## MIXING AND APPLICATION DETAILS

Unite should preferably be applied in the early morning or late afternoon. The rate of application is dependent on the soil fertility and reaction required. The lower rates should be used for maintenance while the higher rates will correct nutritional deficiencies.

## STORAGE

Unite should be stored out of direct sunlight and in a dry and cool place under frost-free conditions. Keep the product locked up and out of the reach of children and pets. Avoid contamination.

يؤات  
هو مركب يندرج تحت مضغرات النمو يحتاجه النبات خلال جميع المراحل  
يحتوي علي نسبة من الاحماض الامينية الحرة ومضغرات النمو

## تعليمات الاستخدام

- لا يخلط يونات مع اي مركب يحتوي علي اسمدة الفوسفات و الزيوت وكذلك المواد القلوية مثل الكبريت الجيري
- التأكد من استخدام الكمية الكافية من المياه عند تطبيق اليونات حتي يتأكد تغطية المحصول بالكامل
- رج العبوة جيداً قبل الاستخدام
- ينصح باستشارة مستشارين الشركة عن البرامج الخاصة بالمركب واي معلومات او نصائح اخري تتعلق بالمركب

## الاستخدام

- يفضل استخدام يونات في الصباح و اخر اليوم للحصول علي افضل النتائج
- معدل الاستخدام يختلف علي حسب عدة عوامل منها معدل الضوية في التربة ورد الفعل المطلق
- المعدلات المنخفضة تستخدم للحفاظ في حين تستخدم المعدلات المرتفعة لاجل تصحيح اوجه القصور الغذائية

## التخزين

- يخزن اليونات في مكان بعيد عن اشعة الشمس المباشرة في مكان جاف بعيد عن ظروف الصقيع
- تحفظ العبوات محكمة الغلاطق
- يحفظ بعيداً عن الأطفال

| المحصول                                       | معدل الاستخدام<br>100\ لتر | معدل الاستخدام<br>للفدان | ملاحظات  |
|---|----------------------------|--------------------------|--|
| المانجو                                       | 150 : 250 سم               | 500 : 800 سم             | يتم التطبيق من بداية تزهر حتي نضج الثمار من 3 : 4 معاملات مع تكرار كل 14 يوم في وقت الاجهاد الحراري لرفع الاجهاد عن النبات   |
| العنب   | 100 : 250 سم               | 800 : 1 000 سم           | يتم الاستخدام من 3 : 6 معاملات علي مدار الموسم ابتداءً من انتفاخ العيون , 10 سم غوات قبل الزهر و 3 : 5 علي حجم العبة , مرحلة النضج يساعد علي سرعة النضج وانتظامية خروج العيون وانتظامية الثمار الخضرية مع عدم وجود تفاوت في تخريج العيون   |
| اشجار الفاكهة<br>الخوخ<br>والمشمش<br>والبرقوق | 200 : 500 سم               | 500 : 800 سم             | من 2 : 8 معاملات خلال الموسم ابتداءً من قبل التزهير , اثناء التزهير مرحلة التحميم يساعد علي زيادة امتلاء الخلايا الداخلية للثمرة لاكمال الحجم واللون ويكرر في بداية مرحلة التحميم من 7 : 15 يوم علي حسب احتياج النبات لرفع الاجهاد عن النبات ويوصي به ايضاً في حالات الاجهاد اثناء خروج الثمار الخضرية |
| البطاطس                                       | 150 : 250 سم               | 500 : 800 سم             | اول بداية الاستخدام مع بداية تحرك النمو الخضري مع تكرار كل من 7 : 10 ايام عند الاحتياج لانه يساعد علي رفع مناعة النبات لمقاومة الاجهاد والامراض الفطرية ويساعد في النمو الخضري وعمليات التحميم   |
| الطماطم<br>و الفلفل                           | 150 : 250 سم               | 500 : 800 سم             | يتم الاستخدام من 3 : 4 معاملات كل 14 : 21 يوم  |
| القرعيات                                      | 150 سم                     | 500 : 1 000 سم           | يتم الاستخدام مع ظهور 3 : 4 وقات ويتم التكرار مع بداية مرحلة التزهير والعقد مرحلة التحميم والتلون  |
| الباذلاء                                      | 150 : 250 سم               | 500 : 800 سم             | يتم اول معاملة مع بداية الثمار , المعاملة الثانية تظهر 4 : 6 وقات مع التكرار كل 14 : 21 يوم عند الاحتياج   |
|   | 150 : 250 سم               | 500 : 800 سم             | يتم الاستخدام كل 14 : 21 يوم طول الموسم  |